

conditions de prélèvement pour suivi thérapeutiques.

Médicament	spécialité	condition de prélèvement
Acide Valproïque	depakine	Taux résiduel avant la prise
A.V.K.	previscan, sintrom....	De préférence au même moment .
Anxiolytiques	Valium , Urbanyl , nordaz, novazam, Praxadium ,	Taux résiduel avant la prise
Carbamazépine	tegretoil	Taux résiduel avant la prise
Ciclosporine	Sandimmun	juste avant la nouvelle prise ou 8 H après une prise de médicament (formes simples)
tacrolimus	Prograf	
Digitoxine	digitaline	juste avant la nouvelle prise ou 8 H après une prise de médicament
Digoxine	digoxine	juste avant la nouvelle prise ou 8 H après une prise de médicament
Héparine calcique	Calciparine	A mi chemin entre 2 injections
Héparine de bas PM	fraxiparine	3 a 5 heures après l'injection
	fragmine	
	Lovenox , innohep ...	
Isoniazide	Rimifon	4 a 6 heures après (formes retard)
Lithium forme standard	Teralithe Neurolithium	Taux résiduel avant la prise
Lithium forme LP		12 heures après la prise du médicament
Phénobarbital	gardenal	Taux résiduel avant la prise
Phényl-hydantoïne (phénytoïne)	di-hydan	Taux résiduel avant la prise
Quinidine		Taux résiduel avant la prise et toujours à la même heure
Thyroxine	Levothyrox	Sans importance